

¿Qué es DLT?

Es una nueva opción de tratamiento de VIH, **más efectiva, más potente y con menores efectos secundarios.**

#1



DLT tiene 3 medicamentos:

- Dolutegravir
- Lamivudina
- Tenofovir

#2



¿Por qué del cambio en mi medicamento?

#3

Como siempre, es clave tomar el medicamento de manera adecuada y a la hora indicada, todos los días.

Este medicamento logra controlar mejor al virus y disminuye las posibilidades de cambiar de tratamiento.

El cambio de medicamento NO significa que su tratamiento actual está fallando. Se lo está cambiando por un medicamento más nuevo y con mayor efectividad.



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

IntraHealth
INTERNATIONAL



PROYECTO CUIDADO Y TRATAMIENTO EN VIH

Este material es posible gracias al generoso apoyo del pueblo de Estados Unidos a través de su Agencia para el Desarrollo Internacional (USAID). El contenido es responsabilidad del autor y no necesariamente reflejan las opiniones de USAID o del gobierno de los Estados Unidos de América".

¿Cuándo y cómo debo tomar (el DLT) mi medicamento?

Se debe tomar una pastilla al día, ya sea durante el desayuno, almuerzo o cena, lo importante es tomarla a la misma hora.

Para algunas personas tomar el medicamento en la noche puede causarle problemas de sueño, si este es su caso consulte a su médico para analizar otros horarios para tomarlo.



¿Puedo sentir algún efecto secundario?



#5

Es posible que durante los primeros 30 días se tenga alguno de los siguientes síntomas: enrojecimiento de la piel o salpullido, diarrea, dolor de cabeza y problemas para dormir. Esto es normal al tomar un nuevo medicamento.

En comparación con el medicamento que usted ha estado tomando, el DLT presenta menores efectos secundarios.

#6

No deje de tomar el medicamento, si tiene algunos de estos síntomas, su organismo está adaptándose a un nuevo medicamento. Si tiene dudas puede llamar al:

SELLO PARA NÚMERO
DE TELÉFONO

¿Qué pasa si soy mujer?

#7

Si no sabe si está embarazada informe a su médico para que le indique una prueba de embarazo previamente antes de iniciar su tratamiento.

Si usted decide embarazarse informe a su médico ya que durante el embarazo usted necesitará un tratamiento diferente, si por el contrario usted no desea tener hijos consulte sobre los diferentes métodos de planificación familiar.

