

#1

DLT


Lo que TU  
necesitas SABER



# #2

## DLT

- Es un nuevo y efectivo medicamento antirretroviral
- Viene en una sola tableta
- Está compuesto por Dolutegravir + Lamivudina + Tenofovir




#3

# BENEFICIOS

- Habilidad para reducir rápidamente el VIH en la sangre
- Sin restricciones con los alimentos
- Con efectos secundarios más tolerables

# #4

# DOSIS

- Una tableta al día para adultos y niños mayores de 6 años
  - Puede tomarse a cualquier hora del día, pero siempre a la misma hora todos los días.
  - Evitar su uso en el primer trimestre de embarazo
  - Mujeres que pueden quedar embarazadas deben seguir un método efectivo de planificación familiar antes de empezar a usar esta medicina. Informe a su médico si tiene planeado quedar embarazada.
- 
- A faint, light blue silhouette of a person's head and shoulders is visible in the background on the right side of the page. The person appears to be holding a small red pill between their fingers.

#5

# EFECTOS SECUNDARIOS

- Alteración del sueño, dolores de cabeza, debilidad, mareos
- Diarrea, dolores abdominales, náuseas, vómitos
- Puede incrementar el apetito

*Por favor reporta cualquier efecto secundario a tu médico*

# #6 INTERACCION CON OTROS MEDICAMENTOS

Interacciones	Comentarios
Antiácidos, calcio, hierro, magnesio, multivitaminas / minerales, selenio, sales de zinc	Usa 2 horas antes o 6 horas después de DLT. Se puede usar al mismo tiempo solo cuando se toma con alimentos
Medicamentos para la diabetes	Controla tu glucosa en sangre.
Medicamentos para la tuberculosis y para la epilepsia	Evita el uso de DLT en la dosis normal, tú medico debe indicarte el ajuste de la dosis

**Consulta a tu médico si estás usando otras medicinas además del DLT**

**USAID PROGRAMA DE CADENA DE SUMINISTROS DE SALUD GLOBAL**  
Adquisiciones y Gestión de Suministros



**USAID**  
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS  
UNIDOS DE AMÉRICA

IntraHealth  
INTERNATIONAL



**PROYECTO CUIDADO Y TRATAMIENTO EN VIH**